

BOTANKERS EN ORTHODONTISCHE SCHROEFJES

Je hebt een afspraak op een van de poliklinieken van Kaakchirurgie Oost-Nederland voor het plaatsen van een botanker of een orthodontisch schroefje. In deze folder lees je informatie over deze behandeling.

DE BEHANDELING

Plaatsen van een botanker

Het plaatsen van een botanker vindt plaats met plaatselijke verdoving. De kaakchirurg maakt een kleine snede in het tandvlees. Daarna wordt het botanker op het kaakbot geplaatst. Dit gebeurt in de bovenkaak ter hoogte van de eerste grote kies en in de onderkaak ter hoogte van de hoektand). De wond wordt gehecht met oplosbare hechtingen. Voor controle wordt na de ingreep een röntgenfoto gemaakt. Je orthodontist krijgt een kopie van deze röntgenfoto. Eén tot twee weken na de ingreep verbindt de orthodontist je beugel met het anker met een elastiekje of orthodontische draad. De botankers kunnen maanden tot jaren blijven zitten. Na afronding van de orthodontische behandeling worden ze meestal weer verwijderd.

Plaatsen van een orthodontisch schroefje

Het plaatsen van een orthodontisch schroefje vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De kaakchirurg plaatst het schroefje met een soort schroevendraaier in het bot. Het kan zijn dat er eerst een klein gaatje geboord moet worden. De schroefjes kunnen maanden tot jaren blijven zitten. Na afronding van de orthodontische behandeling worden ze weer verwijderd.

NA DE BEHANDELING

Na de behandeling kun je last krijgen van de volgende klachten:

- Napijn
- Dikke wang
- Temperatuursverhoging
- Moeilijk te openen mond en moeilijk slikken

Deze klachten kunnen de eerste twee dagen toenemen maar verdwijnen daarna geleidelijk. Raak het botanker of het schroefje de eerste dag niet met uw handen of tong aan.

Zwelling

Het kan zijn dat je wang door de ingreep dik wordt. Houd daarom bij thuiskomst het eerste half uur enkele blokjes ijs in een plastic zakje in een washandje tegen de buitenkant van je wang of lip. De zwelling gaat na twee tot drie dagen vanzelf over.

Medicijnen

Je krijgt vaak een recept voor pijnstillers of andere medicatie. Deze gebruik je volgens voorschrift.

Mondverzorging

Reinig je mond met een normale tandenborstel. De eerste vijf dagen na de behandeling kun je dit aanvullen met het spoelen van de mond met een mondspoelmiddel: chloorhexidine 0,12% (Perio-Aid).

Kaakchirurgie Oost-Nederland
Postbus 50 000
7500 KA Enschede

Telefoon 088 708 33 80

Locatie Almelo
Zilvermeeuw 1

Locatie Hardenberg
Hof van Pepijn 13

Locatie Enschede
Koningsplein 1

Locatie Oldenzaal
Prins Bernhardstraat 17

Eten, drinken en roken

Je mag op de dag van de behandeling alleen zacht voedsel gebruiken. Het is belangrijk dat het botanker of het schroefje niet met hard, kleverig en/of taai voedsel in aanraking komt.

Sporten

Doe de eerste week geen wilde (contact)sporten, draag zo nodig een gebitsbeschermer (die mag niet in contact komen met het anker).

WANNEER MOET IK BELLEN

Losraken botanker of schroefje

Neem contact op met de polikliniek als het botanker of het schroefje los gaat zitten.

Koorts

Krijg je de eerste dagen na de behandeling koorts (hoger dan 38,5°C)? Neem dan contact op met de polikliniek.

Nabloeding

Soms treedt een nabloeding op. Een wondje in de mond geeft altijd een spoortje bloed. Opgelost in speeksel lijkt dit al gauw veel. Bijt in dit geval gedurende 30 minuten krachtig op een gaasje. Vertrouw je het niet? Neem dan contact op met de polikliniek.

Toename pijn

Twee tot vier dagen na de behandeling kan er toename van pijn optreden bij de wond. Deze pijn gaat gepaard met een vieze smaak en een vieze geur. Neem in dit geval contact op met de polikliniek.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is een botanker?

Een botanker is een klein plaatje van metaal (titanium) met twee of drie schroefgaatjes. Aan het einde van het anker zit een klein haakje. Hieraan

kan orthodontische draad of elastiek vastgemaakt worden. Deze draad verbindt de beugel met het botanker en zo staat er extra kracht op de tanden en kiezen. Het botanker draagt zo bij aan de werking van de beugel voor de correctie van de stand van het gebit en/of kaak.

Wat is een orthodontisch schroefje?

Een orthodontisch schroefje is heel klein schroefje van titanium. Een schroefje is gemakkelijker te plaatsen en te verwijderen dan een botanker, maar is ook minder sterk. Aan het schroefje kan orthodontisch draad of elastiek vastgemaakt worden. Deze draad verbindt de beugel met het schroefje en zo staat er extra kracht op de tanden en kiezen. Het schroefje draagt zo bij aan de werking van de beugel voor de correctie van de stand van het gebit en/of kaak.

VRAGEN EN CONTACT

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met Kaakchirurgie Oost-Nederland.

Op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur:

telefoon 088 708 33 80

Buiten deze tijden/spoed:

- ZGT Almelo, telefoon 088 708 78 78
- MST Enschede, telefoon 053 487 20 00

Kiezen voor Kaakchirurgie Oost-Nederland betekent kiezen voor specialistische zorg van hoge kwaliteit. Kwaliteit van jouw leven én goede kwaliteit zorg. De deskundige artsen en medewerkers nemen je klachten serieus. Samen met jou bekijken ze de mogelijkheden en oplossingen die bij jou passen! In elke locatie staat de modernste technologie tot hun beschikking. Zodat je verzekerd bent van de beste zorg.

Versie 17-03

Kaakchirurgie Oost-Nederland
Postbus 50 000
7500 KA Enschede

Telefoon 088 708 33 80

Locatie Almelo
Zilvermeeuw 1

Locatie Hardenberg
Hof van Pepijn 13

Locatie Enschede
Koningsplein 1

Locatie Oldenzaal
Prins Bernhardstraat 17